



ワクチン		種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期										
			生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上			
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②					③			(注1)													
	母子感染予防		①	②					③																		
ロタウイルス	1価	生			①	②		(注2)																			
	5価				①	②	③		(注3)																		
肺炎球菌（PCV13、PCV15）		不活化			①	②	③						④						(注4)								
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③						④				7.5歳まで										
3種混合（DPT）		不活化																① (注5)				② 11-12歳 (注6)					
2種混合（DT）		不活化																				① 11歳	12歳				
ポリオ（IPV）		不活化																① (注7)									
インフルエンザ菌b型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③						④						(注8)								
4種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③						④					7.5歳まで									
BCG		生								①																	
麻疹・風疹混合（MR）		生												①				② (注9)									
水痘		生											①		②				(注10)								
おたふくかぜ		生											①					② (注11)									
日本脳炎		不活化								生後6か月から接種可能							① ②	③	7.5歳まで			④ 9-12歳					
インフルエンザ		不活化								生後6か月から接種可能						毎年（10、11月などに）① ②						13歳以上①					
新型コロナウイルス		mRNA																									
ヒトパピローマ ウイルス（HPV）	9価	不活化																			(注12)	小6	中1① ② (注13)		中2～高1相当	(注14)	
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1 ① ② ③ (注13)		中2～高1相当	(注14)	
ワクチン		種類	生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上			